

Programa de Educação Médica Continuada Atualizações em Alergia e Imunologia

Artigo de revisão

As questões abaixo deverão ser respondidas após leitura do texto “Urticárias físicas: revisão”. Há apenas uma resposta correta, caso haja dúvida consulte novamente o texto.

1. Assinale a alternativa correta

- a) o dermatografismo é raro e está presente somente em 2% a 5% da população geral
- b) as urticárias solar e ao calor, raramente surgem de forma isolada
- c) a urticária ao frio freqüentemente se associa à urticária crônica idiopática
- d) as urticárias físicas, em geral, são menos resistentes à terapia.

2. Com relação à urticária colinérgica é correto afirmar que:

- a) é a forma mais comum de urticária física
- b) normalmente manifesta-se após queda da temperatura corpórea e cutânea
- c) as erupções caracterizam-se por micropápulas, distintas e pruriginosas
- d) as urticárias costumam surgir cerca de três a seis horas após o contato com o estímulo desencadeante

3. Constituem opção terapêutica para o tratamento da urticária de pressão tardia, exceto:

- a) ácido tranexânico
- b) dapsona
- c) corticosteróides
- d) anti-histamínico

4. Qual das características clínicas abaixo é sugestiva de urticária de pressão tardia?

- a) edema profundo e doloroso após aplicação de pressão local
- b) eritema minutos após aplicação de pressão local
- c) intenso prurido
- d) angioedema palpebral

5. Com relação à urticária solar assinale a alternativa correta:

- a) as lesões em geral são pouco pruriginosas
- b) as exposições prolongadas à luz solar causam tipicamente ardência local
- c) nunca se acompanha de manifestações sistêmicas
- d) as lesões que são sempre transitórias, muitas vezes não são urticariformes

6. Qual das alternativas abaixo é característica da urticária pelo frio?

- a) pápulas em qualquer parte do corpo, exceto mãos e pescoço
- b) lesões que duram tipicamente mais de duas horas
- c) ausência de angioedema, quando há pápulas
- d) há risco de anafilaxia

7. Com relação à urticária aquagênica, assinale a alternativa correta:

- a) o uso de escopolamina tópica pode prevenir o aparecimento de lesões
- b) as lesões surgem logo após contato com água fria
- c) as lesões surgem preferencialmente em membros inferiores e pés
- d) é mais comum em homens a partir da 3ª década de vida

8. Com relação à anafilaxia induzida por exercícios urticária solar assinale a alternativa incorreta:

- a) alguns pacientes apresentam sintomas apenas se o exercício for realizado após ingestão de alguns alimentos.
- b) a incidência é maior em adultos jovens
- c) o quadro clínico surge após a realização de exercícios vigorosos, desde que determinados alimentos sejam ingeridos antes do exercício.
- d) o uso de ácido acetil-salicílico pode estar implicado no desencadeamento do quadro

Respostas corretas do teste sobre Educação Médica Continuada “Marcha atópica” publicado na revista da SBAI volume 31, nº 4, 2008, páginas 139 a 145

Respostas corretas: 1)b; 2)c; 3)d; 4)b; 5)e; 6)a; 7)c; 8)c; 9)a; 10)c