

Programa de Educação Médica Continuada Atualizações em Alergia e Imunologia

Artigo de revisão

As questões abaixo deverão ser respondidas após leitura do texto “Marcha atópica”. Há apenas uma resposta correta, caso haja dúvida consulte novamente o texto.

1. **O conceito de marcha atópica diz respeito à:**
 - a) migração dos linfócitos T CLA+
 - b) seqüência típica de progressão dos sinais clínicos da doença atópica
 - c) hiperreatividade brônquica observada em riníticos
 - d) maior prevalência de asma observada nas últimas décadas
 - e) deposição de colágeno na pele atópica
2. **Os linfócitos fetais humanos apresentam um perfil predominantemente:**
 - a) Th1
 - b) Th0
 - c) Th2
 - d) Treg
 - e) Th17
3. **Estudos clínicos têm demonstrado que, em indivíduos predispostos, as doenças atópicas ocorrem de forma seqüencial em:**
 - a) 100% das vezes
 - b) 10% das vezes
 - c) 90% das vezes
 - d) 50% das vezes
 - e) as doenças atópicas não ocorrem de forma seqüencial
4. **No conceito de marcha atópica, considera-se como a porta de entrada das doenças atópicas a:**
 - a) Asma
 - b) Dermatite atópica
 - c) Rinite alérgica
 - d) Dermatite de contato
 - e) Dermatite seborréica
5. **Na pele escoriada, a sensibilização com antígenos de ácaros:**
 - a) Diminui a expressão de citocinas perfil Th1
 - b) Aumenta a expressão de IL-4
 - c) Aumenta a produção de IgE
 - d) Estimula a infiltração eosinofílica cutânea
 - e) Todas as anteriores
6. **As células apresentadoras de antígenos de indivíduos com dermatite atópica caracterizam-se por apresentarem em sua superfície:**
 - a) Receptores de alta afinidade para IgE
 - b) Receptores de baixa afinidade para IgE
 - c) Receptores Toll-like
 - d) Receptores para glicocorticoide
 - e) Ausência de receptores
7. **Os linfócitos T CLA+ tendem a migrar seletivamente para sítios:**
 - a) Pulmonares
 - b) Nasais
 - c) Cutâneos
 - d) Mesentéricos
 - e) Oculares

8. O aumento da prevalência das doenças atópicas observado nas últimas décadas parece estar associado principalmente a:

- a) Mutações genéticas
- b) Diferenças geográficas
- c) Fatores ambientais
- d) Alterações psicológicas
- e) Melhoria dos métodos diagnósticos

9. A incapacidade de resposta à endotoxina observada em alguns indivíduos atópicos deve-se a alterações nos:

- a) Receptores Toll-like
- b) Macrófagos
- c) Eosinófilos
- d) Queratinócitos
- e) Processos de oxi-redução intracelular

10. Podemos afirmar que:

- a) Não existe nenhuma inter-relação entre dermatite atópica, rinite e asma
- b) Todo asmático é atópico
- c) Na marcha atópica, a sensibilização epicutânea precede a sensibilização das vias aéreas
- d) A presença de dermatite atópica está associada a menor gravidade da asma
- e) A rinite alérgica não é um fator de risco para o desenvolvimento de asma

Respostas corretas do teste sobre Educação Médica Continuada “Alergia a Sulfa” publicado na revista da SBAI volume xx, nº 3, 2008, páginas xx a cc

Respostas corretas: 1) a; 2) c; 3) b; 4) c; 5) b; 6) c; 7) d; 8) d